

Patientinformation Prednisolon

Prednisolon är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

Dosering

Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen ska avslutas bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra. Avbryt ej behandlingen utan att rådgöra med läkare. Läkare bör kontakts vid påfrestningar som feber och stress, en dosändring kan bli aktuell då. Om Prednisolon tas på morgonen (kl 8) verkar medicinen i takt med binjurebarkens naturliga dygnsrytm och medför minimal binjurebarkshämning. Denna doseringstyp kan generellt provas i första hand.

Att tänka på

Behandlingseffekten kan påverkas om Prednisolon tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot tuberkulos och epilepsi, liksom vid vaccination. Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med Prednisolon och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID).

Om du lider av diabetes, högt blodtryck, psykiska sjukdomar, hjärtfunktionsnedsättning, magsår, vissa infektioner, nyanlagda blodkärl, tarmförbindelser eller benskörhet bör du meddela läkaren det.

Biverkningar

Uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Vanliga biverkningar är vätskeansamling, högt blodtryck, försämrad sårhäkning, förhöjd sockerhalt i blod och urin samt benskörhet.

Undrar du över andra biverkningar – rådgör med din hudläkare.

